

GUSELKUMAB

¿Para que sirve?:


El Guselkumab detiene la acción de ciertas células en el cuerpo que causan síntomas de psoriasis. Por tal motivo está indicado en el tratamiento de:

- Artritis psoriásica que no ha respondido a tratamientos previos.
- Psoriasis en placas moderada-grave que no ha respondido a otros tratamientos.



¿Cómo usarlo adecuadamente?

El guselkumab viene en un dispositivo de inyección automática para ser aplicado vía subcutánea (debajo de la piel) una vez cada 4 semanas (las primeras dos dosis) y luego cada 8 semanas.




Puede administrarlo en cualquier lugar de la parte delantera de los muslos (parte superior de la pierna), parte trasera de la parte superior de los brazos o en el abdomen (estómago), excepto en ombligo y en el área de 2 pulgadas (5 centímetros) a su alrededor. Para reducir las posibilidades de dolor o enrojecimiento, utilice un lugar diferente para cada inyección. No la inyecte en un área donde la piel esté sensible, con moretones, roja, o dura.

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Retire la jeringa del refrigerador, colóquela en una superficie plana sin retirar la tapa de la aguja o dispositivo, y deje que se caliente a temperatura ambiente durante aproximadamente 30 minutos antes de inyectar el medicamento.
- No intente calentar el medicamento en un horno de microondas, colocándolo en agua caliente, dejándolo bajo la luz solar o por cualquier otro método.
- Lávese las manos antes de aplicar la inyección de guselkumab y cuidado de no exceder los 5 minutos de retirar la tapa de la aguja. No reemplace la tapa de la aguja o el dispositivo porque esto puede dañar la aguja o causar lesiones. No use un dispositivo de inyección automática si se ha caído después de quitar la tapa.

Almacenamiento

- No utilice este medicamento después de la fecha de vencimiento
- Conservar en la caja para protegerla de la luz.
- Conservar en nevera (2°C–8°C), en la parte media de la nevera. No congelar.
- No agitar.
- No use este medicamento si advierte que está turbio o tiene un color anormal, o contiene partículas grandes.
- Nota si pierde la refrigeración o se guarda en el congelador, comuníquese con nosotros.



Disposición final

No deseche las jeringas directamente a la basura, almacene en un recipiente resistente como una botella de detergente limpia y opaca.


Olvidos o interrupciones del tratamiento

Use la dosis que omitió tan pronto como lo recuerde y luego continúe con su programa de dosificación regular. No duplique la dosis para compensar la que omitió. Llame a su médico si no tiene claro su programa de dosificación

Efectos Secundarios

La mayoría de las personas no experimentan todos los efectos secundarios, sin embargo, estos son los que más frecuente se presentan:

- Fiebre o síntomas pseudogripales,
- Dolores musculares
- Tos y/o dificultad para respirar.
- escozor al orinar u orinar con más frecuencia de la habitual
- Diarrea o dolor de estómago
- Hinchazón de la cara, los labios, la lengua o la garganta.



Informe a su médico líder o reumatólogo si presenta

- Sarpullido
- Urticaria
- Picazón
- Sensación de desmayo o aturdimiento
- Hinchazón de la cara, ojos, labios, boca, garganta, o lengua
- Dificultad para respirar
- Opresión en el pecho o la garganta
- En caso de presentar signos o síntomas que sugieran infección
- Si ha presentado vacunación reciente con virus vivos atenuados (Sarampión, paperas, rubéola, vacuna MMR combinada, rotavirus, viruela, varicela, fiebre amarilla)
- Sí tiene cirugías programadas
- Sí lleva más de seis meses con el tratamiento y no está mejorando

Importante: Informe a su médico o farmacéutico algún síntoma extraño que presente e incluso si se trata de síntomas que no se mencionaron anteriormente

¿Qué hacer en caso de emergencia?



- Acuda a su servicio de urgencias más cercano y/o asignado por su asegurador (EPS)
- Informe a su médico tratante
- Contacte con los teléfonos de IPS Especializada que corresponde a la sede donde normalmente es atendido..