

# CERTOLIZUMAB

## ¿Para que sirve?:


El certolizumab pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores del factor de necrosis tumoral (tumor necrosis factor, TNF). Funciona al bloquear la actividad del TNF, una sustancia en el cuerpo que causa inflamación, por tal motivo está indicado para.

- Artritis reumatoide.
- Espondiloartritis axial (incluyendo espondilitis anquilosante y espondiloartritis axial sin evidencia radiográfica de espondilitis anquilosante).
- Artritis psoriásica.



## ¿Cómo usarlo adecuadamente?

El certolizumab viene en un dispositivo de inyección automática para ser aplicado vía subcutánea (debajo de la piel). La frecuencia de administración será definida por el médico tratante.



Puede administrarlo por vía subcutánea en cualquier lugar de la parte delantera de los muslos (parte superior de la pierna), parte trasera de la parte superior de los brazos o en el abdomen (estómago), excepto en ombligo y en el área de 2 pulgadas (5 centímetros) a su alrededor. Para reducir las posibilidades de dolor o enrojecimiento, utilice un lugar diferente para cada inyección. No la inyecte en un área donde la piel esté sensible, con moretones, roja, o dura

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Retire la jeringa del refrigerador, colóquela en una superficie plana sin retirar la tapa de la aguja o dispositivo, y deje que se caliente a temperatura ambiente durante aproximadamente a 15 minutos antes de inyectar el medicamento.
- No intente calentar el medicamento en un horno de microondas, colocándolo en agua caliente, dejándolo bajo la luz solar o por cualquier otro método.
- Lávese las manos antes de aplicar el medicamento.
- No retire el tapón de la jeringa prellenada mientras deja que el medicamento llegue a temperatura ambiente. Debe quitar la tapa no más de 5 minutos antes de inyectarse el medicamento. No vuelva a colocar el tapón después de retirarlo.
- No use la jeringa si se le cae al suelo.

## Almacenamiento

- No utilice este medicamento después de la fecha de vencimiento
- Conservar en la caja para protegerla de la luz.
- Conservar en nevera (2°C–8°C), en la parte media de la nevera. No congelar.
- No agitar.
- No use este medicamento si advierte que está turbio o tiene un color anormal, o contiene partículas grandes.
- Nota si pierde la refrigeración o se guarda en el congelador, comuníquese con nosotros.





## Disposición final

No deseche las jeringas directamente a la basura, almacene en un recipiente resistente como una botella de detergente limpia y opaca.

## Olvidos o interrupciones del tratamiento

Inyecte la dosis que olvidó tan pronto como la recuerde. Si ya casi es hora de la próxima dosis, omita la dosis que le faltó y continúe con su programa regular de dosificación. No inyecte una dosis doble para compensar la que omitió.

## Efectos Secundarios

La mayoría de las personas no experimentan todos los efectos secundarios, sin embargo, estos son los que más frecuente se presentan:

- Enrojecimiento, picazón, dolor o hinchazón en el sitio de la inyección
- Dolor de cabeza
- Dolor de espalda



## ¿Cuándo no tomar o suspender el medicamento?

- Si tiene cualquier tipo de infección activa, pues este medicamento puede disminuir su capacidad de combatir las infecciones por tal motivo no debe aplicarse en estas situaciones.
- Si tiene programada una cirugía o intervención dental.
- Si ha tenido tuberculosis o ha estado en contacto con alguien con tuberculosis.
- Si está en embarazo o planea estarlo, o si está en periodo de lactancia, este medicamento debe evitarse en estos casos. Debe evitar la concepción hasta tres meses después de terminar el tratamiento, solo se debe utilizar en estos casos si es clínicamente necesario bajo la supervisión de un profesional sanitario.
- Si ha recibido alguna vacuna recientemente o si requiere vacunación con gérmenes vivos o atenuados, se deberá suspender el medicamento Certolizumab previo a la vacunación.

## ¿Qué hacer en caso de emergencia?



- Acuda a su servicio de urgencias más cercano y/o asignado por su asegurador (EPS)
- Informe a su médico tratante
- Contacte con los teléfonos de IPS Especializada que corresponde a la sede donde normalmente es atendido..