

ALGASIDALSA BETA

¿Para que sirve?:

se utiliza para tratar a pacientes con diagnóstico confirmado de enfermedad de Gaucher de tipo I o III y que presenten signos de la enfermedad como: anemia (escasez de glóbulos rojos), tendencia a sangrar con facilidad (debido a la escasez de plaquetas), hipertrofia del bazo o del hígado u osteopatía (enfermedad ósea).



¿Cómo usarlo adecuadamente?

Este medicamento debe utilizarse exclusivamente bajo la debida supervisión de un médico con experiencia en el tratamiento de la enfermedad de Gaucher. Debe ser administrado por un médico o profesional de enfermería mediante perfusión intravenosa. Se aplica cada dos semanas.

Olvidos o interrupciones del tratamiento

Si falta a una cita para administración de algasidalsa beta, llame a su médico de inmediato

Efectos Secundarios

La mayoría de las personas no experimentan todos los efectos secundarios, sin embargo, estos son los que más frecuente se presentan está relacionado con Reacciones alérgicas, que aparecen durante la perfusión o poco tiempo después. Entre los síntomas reportados están:

- Fiebre
- Sensación de frío
- Náuseas
- Vómitos
- Cefaleas
- Sensaciones anormales en la piel como ardor u hormigüeo.



Puede que su médico decida reducir la velocidad de perfusión o administrar medicamentos adicionales para evitar que ocurran tales reacciones.

Informe a su médico líder o especialista...

- Es ha presentado alergia al medicamento.
- Si está embarazada, tiene planificado quedar embarazada o está amamantando. Llame a su médico si queda embarazada mientras usa el medicamento

¿Qué hacer en caso de emergencia?



- Acuda a su servicio de urgencias más cercano y/o asignado por su asegurador (EPS)
- Informe a su médico tratante
- Contacte con los teléfonos de IPS Especializada que corresponde a la sede donde normalmente es atendido.

Fuentes de información

[Centro de información online de medicamentos de la AEMPS - CIMA](#)