

LEFLUNOMIDA



¿Para que sirve?:

La leflunomida pertenece a una clase de medicamentos llamados medicamentos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Actúa disminuyendo la inflamación y enlenteciendo el progreso de la afección, lo que puede ayudar a mejorar la actividad física de personas con:

- Artritis reumatoide.
- Artritis psoriásica.

¿Cómo usarlo adecuadamente?

La leflunomida viene en comprimido para administración oral, la dosis se puede ajustar durante los tres primeros días. Se puede tomar en cualquier momento tanto antes, como durante, después o entre las comidas, pero una vez elegida la hora de la toma, siempre se debe seguir el mismo horario. Hay que tomar el comprimido entero con suficiente líquido, idealmente con agua. No es recomendable tomar bebidas alcohólicas mientras se siga tratamiento con leflunomida, ya que se podría potenciar un posible daño en el hígado

Almacenamiento

No dejar al alcance de niños o mascotas, evite áreas muy húmedas como el baño o cerca a fuentes de calor como la cocina, evite exposición directa a los rayos del sol por lo cual no se debe dejar cerca de ventanas.

Procure romper las cajas del medicamento cuando termine su contenido. En caso de que no se consuma todas las cápsulas, diríjase a un punto azul para su desecho

Olvidos o interrupciones del tratamiento

Si olvida tomar una dosis, tómela en cuanto se acuerde. No obstante, si ya casi es hora de la dosis siguiente, deje pasar la que olvidó y continúe con su horario de medicación normal. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó.

Efectos Secundarios

La mayoría de las personas no experimentan todos los efectos secundarios, sin embargo, estos son los que más frecuente se presentan:

- Diarrea
- Dolor de estómago
- Cansancio extremo
- Debilidad
- Palidez
- Latidos cardíacos rápidos
- Falta de aire



Informe a su médico líder o reumatólogo si...

- Es alérgico al a la leflunomida.
- Si tiene o ha tenido infecciones graves o si contrae con frecuencia infecciones, si tiene o ha tenido cáncer u otras afecciones que afecten la médula ósea o el sistema inmunitario (incluido el virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida [SIDA]), diabetes, o enfermedad de los riñones.
- Si está embarazada, tiene planificado quedar embarazada o está amamantando. Llame a su médico si queda embarazada mientras usa la leflunomida.
- Si ha tenido tuberculosis o ha estado en contacto con alguien con tuberculosis.
- Tenga en cuenta que la leflunomida puede provocar presión arterial alta. Debe medirse la presión arterial antes de comenzar el tratamiento y periódicamente mientras toma este medicamento.

¿Qué hacer en caso de emergencia?

- Acuda a su servicio de urgencias más cercano y/o asignado por su asegurador (EPS)
- Informe a su médico tratante
- Contacte con los teléfonos de IPS Especializada que corresponde a la sede donde normalmente es atendido.

