

ETANERCEPT

¿Para que sirve?:


Etanercept es un medicamento biológico que logra controlar estas patologías al disminuir la actividad del sistema inmune bloqueando específicamente un grupo de defensas del cuerpo llamadas α -TNF. Se prescribe para el manejo de enfermedades autoinmunes:

- Artritis reumatoide (AR) moderada a grave.
- Artritis juvenil idiopática poliarticular (AJI), moderada a grave.
- Artritis psoriásica activa (aps).
- Poliartritis,
- Oligoartritis.
- Espondilitis anquilosante
- Espondiloartritis axial no radiográfica



¿Cómo usarlo adecuadamente?

- Este medicamento puede encontrarse en presentación para infusión la cual se administra por vía intravenosa. La aplicación se realizará semanalmente siempre el mismo día de la semana. Esta administración puede tardar unos 30 minutos.
- También puede encontrarse en jeringa prellena para administración subcutánea (debajo de la piel), La frecuencia es la misma que cuando se usa la presentación Intravenosa.



Puede administrarlo por vía subcutánea en cualquier lugar de la parte delantera de los muslos (parte superior de la pierna), parte trasera de la parte superior de los brazos o en el abdomen (estómago), excepto en ombligo y en el área de 2 pulgadas (5 centímetros) a su alrededor. Para reducir las posibilidades de dolor o enrojecimiento, utilice un lugar diferente para cada inyección. No la inyecte en un área donde la piel esté sensible, con moretones, roja, o dura

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Retire la jeringa del refrigerador, colóquela en una superficie plana sin retirar la tapa de la aguja o dispositivo, y deje que se caliente a temperatura ambiente durante aproximadamente a 15 minutos antes de inyectar el medicamento.
- No intente calentar el medicamento en un horno de microondas, colocándolo en agua caliente, dejándolo bajo la luz solar o por cualquier otro método.
- Lávese las manos antes de aplicar el medicamento.
- No retire el tapón de la jeringa prellena mientras deja que el medicamento llegue a temperatura ambiente. Debe quitar la tapa no más de 5 minutos antes de inyectarse el medicamento. No vuelva a colocar el tapón después de retirarlo.
- No use la jeringa si se le cae al suelo.

Almacenamiento

- No utilice este medicamento después de la fecha de vencimiento
- Conservar en la caja para protegerla de la luz.
- Conservar en nevera (2°C–8°C), en la parte media de la nevera. No congelar.
- No agitar.
- No use este medicamento si advierte que está turbio o tiene un color anormal, o contiene partículas grandes.
- Nota si pierde la refrigeración o se guarda en el congelador, comuníquese con nosotros.





Disposición final

No deseche las jeringas directamente a la basura, almacene en un recipiente resistente como una botella de detergente limpia y opaca.

Olvidos o interrupciones del tratamiento

Se deberá inyectar la dosis tan pronto como se recuerde, a no ser que la próxima dosis esté programada para el día siguiente, en cuyo caso deberá omitir la dosis olvidada. No se inyecte una dosis doble (dos dosis en el mismo día) para compensar la dosis olvidada

Efectos Secundarios

La mayoría de las personas no experimentan todos los efectos secundarios, sin embargo, estos son los que más frecuente se presentan:

- Infecciones (respiratorias, urinarias o cutáneas), fiebre, dolor de cabeza, prurito, erupción cutánea.
- Reacciones alérgicas
- Reacciones en la zona de inyección (sangrado, hematoma, eritema, picor, dolor, edema)



Informe a su médico líder o reumatólogo si...

- Es alérgico al etanercept.
- Si tiene o ha tenido convulsiones; una enfermedad que afecte el sistema nervioso, como la esclerosis múltiple (EM; pérdida de coordinación, debilidad y entumecimiento debido a daños en los nervios), mielitis transversa (inflamación de la médula espinal que puede causar sensaciones anormales, pérdida de sensibilidad o pérdida de la capacidad de mover la parte inferior del cuerpo), síndrome de Guillain-Barré (debilidad, hormigueo y posible parálisis debido a daños repentinos en los nervios) o neuritis óptica (inflamación del nervio que envía mensajes del ojo al cerebro); problemas de hemorragia; enfermedad del hígado o insuficiencia cardíaca.
- Si está embarazada, tiene planificado quedar embarazada o está amamantando. Llame a su médico si queda embarazada mientras usa el medicamento
- Si se someterá a una cirugía, incluida una cirugía dental.
- Informe a su médico si ha recibido recientemente alguna vacuna o tiene programado recibir una. No se vacune mientras esté usando etanercept o durante 3 meses después de su dosis final de etanercept sin consultar a su médico.
- Si se ha expuesto a la varicela mientras utiliza productos de la inyección de etanercept, llame a su médico inmediatamente.

¿Qué hacer en caso de emergencia?



- Acuda a su servicio de urgencias más cercano y/o asignado por su asegurador (EPS)
- Informe a su médico tratante
- Contacte con los teléfonos de IPS Especializada que corresponde a la sede donde normalmente es atendido..